



Affix patient's label if available

Patient Name

Hospital Number

HKID No.

Sex/ Age

Ward/ Bed

同意接受羊膜穿刺須知

Document No. OGP0002(I)-C

Approved by: Prenatal Diagnostic and Counselling Division, TYH

適應症：

- 產前唐氏綜合症篩查測試呈陽性
- 其他 _____

羊水是用來檢查下列疾病／情況

胎兒有上述疾病／情況的機會是

_____ (請註明估計的機會)

羊膜穿刺程序：

- 用幼針穿過產婦肚皮，子宮壁及羊膜，抽取羊水作測試。
- 不需要麻醉。
- 會用超聲波監察穿刺及抽取過程。

羊水將用作以下測試：

- 染色體檢查
- 傳統細胞遺傳學（需要三星期時間有報告，將檢查所有染色體，可確診胎兒是否有唐氏綜合症及其他染色體數量異常的病，但不能排除微小的染色體缺失，重覆或倒排等問題，也不能排除基因異常引起的遺傳病和其他先天異常。）
- 快速測試（需要三工作天時間有報告，將檢查部份指定染色體，可初步檢查該染色體數目的異常，但不能排除微小的染色體缺失，重覆或倒排，或鑲嵌性染色體異常等問題。也不能排除基因異常引起的遺傳病和其他先天異常等問題。）
- 其他： _____

_____ (註明何種測試，目的及局限)

羊膜穿刺的風險：

- 0.1 - 0.2% 的產婦會在進行羊膜穿刺後流產。
- 14 週以前做羊膜穿刺會增加胎兒的呼吸問題及關節畸形。
- 子宮內感染：一般來說，因產前入侵性檢驗而引致胎兒子宮內感染的機會很低，但是乙型肝炎或愛滋病毒攜帶者的胎兒便有機會因入侵性檢驗而受感染。故此，可考慮等候以上報告有結果後才進行入侵性檢驗。如急於進行羊膜穿刺檢驗，便須冒胎兒受子宮內感染的風險。
- 其他嚴重併發症很罕見。

Affix patient's label if available

Patient Name

Hospital Number

HKID No.

Sex/ Age

Ward/ Bed

羊膜穿刺後的護理：

- 當天不要作劇烈運動或粗重工作。
- 不需要卧床休息。
- 任何時間出現陰道出血、流水、腹痛或發燒，應立刻請教醫生或到就近急症室求診。

如果我不接受羊膜穿刺會有什麼後果？

- 你可能不會得到確診胎兒健康情況的資料。例如，不做染色體測試便不能在產前確診胎兒是否有唐氏綜合症。
- 因個別情況而異的具體後果。（請註明） _____

羊膜穿刺以外的其他選擇？（請刪去不適用者）

- 如果之前沒作唐氏綜合症篩查測試，你可考慮先作篩查測試。篩查測試可檢出 70-90%的唐氏綜合症胎兒，但不能保證胎兒一定沒有唐氏綜合症。（如已接受篩查並且是陽性，或羊膜穿刺的目的非為唐氏綜合症測試。請刪去此項）
- 絨毛膜活檢或臍帶穿刺。
- 詳細的超聲波檢查可能會提供一些關於胎兒的資料，但一般不能確診你需要確診的病症。例如，超聲波檢查可顯示胎兒有唐氏綜合症的機會較低或較高，但不能確診胎兒是否有唐氏綜合症。
- 嬰兒出生後的體格檢查或其他測試，亦可以確診病症。
- 其他： _____

其他討論：（如有）

我 同意 / 不同意 於檢測完成後以不記名形式儲存我的羊水樣本，以作為學術研究或刊載之用。我明白所提供的個人資料及測試結果均絕對保密。

孕婦簽署： _____

日期： _____