Group the case notes from 1 to 5. Group other forms, chart, etc. in Group 5.

n	E 33	瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL
---	-------------	-----------------------------

同	意接受經腹	部抽取	絨毛膜	活檢	前須
4 П					

Affix patient's label if available Patient Name				
Hospital Number	HKID No.			
Sex/ Age	Ward/ Bed			

Document No. OGPD0003(I)-C

Approved by: Prenatal Diagnostic and Counselling Division, TYH

絨毛膜是胎盤組織的學名,絨	ŧ	膜活	檢
又可稱抽絨毛膜或俗稱抽胎盤	,	簡稱	CVS

L /-1			
甘佃			
光世			

絨毛膜是用來檢查下列疾病/情況

胎兒有上述疾病/情況的機會是

(請註明估計的機會)

絨毛膜活檢 (經腹部抽取)程序:

- 於產婦腹部注射局部麻醉。
- 用針穿過產婦肚皮及子宮壁進入胎盤,抽取少量絨毛膜作測試。
- 會用超聲波監察穿刺和抽取過程。

絨毛膜將用作以下測試:

	染	午	蛐	检	本
	-11-	щ,	日日	17. P.P.	TI.

傳統細胞遺傳學(需要三星期時間有報告,將檢查所有染色體,可確診胎兒是否有唐氏綜
合症及其他染色體數量異常的病,但不能排除微小的染色體缺失,重覆或倒排等問題,也
不能排除基因異常引起的遺傳病和其他先天異常。)

快速測試(需要三工作天時間有報告,將檢查部份指定染色體,可初步檢查該染色體數目
的異常,但不能排除微小的染色體缺失,重覆或倒排,或鑲嵌性染色體異常等問題。也不
能排除其因異党引起的遺傳病和其他先天異党等問題。)

其他:			
_			
-			

(註明何種測試,目的及局限)



Affix patient's label if available Patient Name		
Hospital Number	HKID No.	
Sex/ Age	Ward/ Bed	

絨毛膜活檢的風險:

- 0.1-0.2%的產婦會在進行絨毛膜活檢後流產。
- 10 週以前做絨毛膜活檢會增加胎兒的四肢缺損的機會。
- 子宮內感染:一般來說,因產前入侵性檢驗而引致胎兒子宮內感染的機會很低,但是乙型肝炎或愛滋病毒攜帶者的胎兒便有機會因入侵性檢驗而受感染。故此,可考慮等候以上報告有結果後才進行入侵性檢驗。如急於進行絨毛膜活檢,便須冒胎兒受子宮內感染的風險。
- 其他嚴重併發症很罕見。

絨毛膜活檢後的護理:

- 當天不要作劇烈運動或粗重工作。
- 不需要卧床休息。
- 任何時間出現陰道出血、流水、腹痛或發燒,請立刻請教醫生或到就近急症室求診。

需要跟進的程序:

大約 1%的案例需進行另一個檢查(如羊膜穿刺)。如抽取過程中,母體的組織混進絨毛膜, 或絨毛膜量太少,或測試結果顯示胎盤的染色體可能未能反映胎兒的染色體。

絨毛膜活檢以外的其他選擇? (請刪去不適用者)

- 如果之前沒作唐氏綜合症篩查測試,你可考慮先作篩查測試。篩查測試可檢出 70-90%的唐氏綜合症胎兒,但不能保証胎兒一定沒有唐氏綜合症。(如已接受篩查並且是陽性,或羊膜穿刺的目的非為唐氏綜合症測試,請刪去此項)
- 你可以在懷孕 16 週後接受羊膜穿刺,一樣可以得到所需的檢測結果。如果連羊膜穿刺也不接受,你可能不會得到確診胎兒健康情況的資料。例如,不做染色體測試便不能在產前確診胎兒是否有唐氏綜合症。
- 臍帶穿刺。
- 詳細的超聲波檢查可能會提供一些關於胎兒的資料,但一般不能確診你需要確診的病症。例如, 超聲波檢查可顯示胎兒有唐氏綜合症的機會較低或較高,但不能確診胎兒是否有唐氏綜合症。
- 嬰兒出生後的體格檢查或其他測試,亦可以確診病症。

• 其他:		
其他討論: (如有)		
我 <u>□ 同意 / □ 不同意</u> 於檢測完 我明白所提供的個人資料及測試約	E成後以不記名形式儲存我的絨毛膜 結果均絕對保密。	樣本,以作為學術研究或刊載之用
孕婦簽署:	日期:	