

 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No	OGGO-0510-03-13-C-(1)
	Subject 化學治療之副作用及護理須知 – Avastin	Issue Date	Jul 2016
		Review Date	Jul 2019
		Approved by	Gynae-Oncology Team, QMH
		Page	Page 1 of 1

Avastin (Bevacizumab)

Avastin 是一種單株抗體標靶藥物，通常會與化療藥物一併使用，以靜脈滴注形式使用，每三星期為一週期，合共 36 期，但可能因病情惡化或嚴重副作用而停止

首次 Avastin 的滴注時間須為 90 分鐘，經過第一次滴注後，如患者沒有出現不良的滴注反應，往後的滴注時間可能會調低至 60 分鐘，甚至 30 分鐘

較常見之副作用	護理須知
高血壓 	在接受 Avastin 期間及停藥後，應每兩至三星期量血壓，如有血壓高的情況出現，醫生會考慮處方口服血壓藥
流鼻血 	輕微流鼻血情況一般會自動停止，或以紙巾握住鼻子後停止，但如果流鼻血情況在 10 分鐘後仍未停止，請到附近診所或醫院求醫
蛋白尿 	病人可能會出現蛋白尿情況從而影響腎功能，醫生會在覆診時安排檢驗尿液中蛋白質量及抽血檢查腎功能
肚瀉 	<ul style="list-style-type: none"> • 喝大量的水 • 避免飲用酒精或含有咖啡因的飲料，如茶、咖啡等 • 服用醫生處方的止瀉藥物
白血球減少	<ul style="list-style-type: none"> • 白血球過低會容易造成感染 • 經常洗手，保持個人衛生 • 避免接觸傳染病（如感冒）病人 • 如發燒（高於華氏 100.4 度 / 攝氏 38° 度），疲倦或有任何感冒徵兆，請立刻到附近診所或醫院求醫
腹痛 	可服用醫生處方的止痛藥
嚴重但較少見的副作用	腸道出血，深靜脈血栓

備註：不同病人對化療的副作用各有不同，應以個人於每次化療後的反應作比較，並於覆診時告訴醫生有關情況